

如何服用：肛交使用的預防性投藥2-1-1


性行為前

- 性行為發生前2小時至24小時內請服用2劑預防性投藥


性行為後

- 在第一次服用2劑預防性投藥的24小時後，服用1劑，接著再第一次服用2劑之後的48小時，再服用1劑
- 每24小時持續服用1劑預防性投藥，直到“最後一次性行為”的2天後。（例如範例2: 週日為最後一次性行為，預防性投藥需服用至週二）

範例 1:單次性行為



範例 2:多次性行為



- 若距離最後一次服用預防性投藥2-1-1 的7天內再次服用時，您只需要服用1劑。
- 若距離最後一次服用預防性投藥2-1-1的7天或以上，重新服藥時需服用2劑。

其他重點...

- 任何性行為都服用預防性投藥 2-1-1。請勿挑選或選擇時間服用2-1-1。
- 每日服用時間相似(+/- 2小時)。我們建議設置鬧鐘或提醒。
- 若每日服用的預防性投藥比較適合您，任何時間都可以切換成每日服用的預防性投藥。
- 若您不確定何時結束或忘記服用，持續每日服用預防性投藥，並且聯絡您的預防性用藥接洽人員／供藥人員協助，或是若有需要請前往緊急護理中心。

每日服藥與211用藥差異

	每日預防性投藥	預防性投藥 211
誰可以用？	任何人	僅為肛交。對於接受陰道／前洞性行為沒有明顯效果
什麼時候可以使用？	適用於每個人	必須在每次性行為使用。不建議挑選和選擇
效用	根據目前證據沒有差別	根據目前證據沒有差別
用藥	服用藥物比較簡單 每天	服用211需要規劃計畫和提醒
忘記服藥	一週內服用5或更多劑則沒有關係	有影響
副作用	沒有差別	沒有差別
規劃	性行為前後無需規劃	性行為前2小時需服用預防性投藥
B型肝炎	有慢性B型肝炎也可每日服用	服用時有慢性B型肝炎則有潛在危險
價格	可能比您支付的藥物更貴	可能比您支付的藥物更便宜

預防性投藥211需持續的服用以達到最大效果。使用鬧鐘或服藥計時器確保您持續定時服用藥物。

美國食品藥物管理局的註記

每日服用的Truvada[®]是目前唯一美國食品藥物管理局核准服用預防性投藥的服用計畫。其他的預防性投藥211/需求性服用計畫並沒有被美國食品藥物管理局特別認同，如Gilead製藥公司，並沒有向美國食品藥物管理局提出核准的替代服用計畫。但有大量的出版證據證明此服用計畫為有效，比起Truvada[®]，每日用藥會需要更少終生攝取量。